

底質測定結果

採泥日：平成27年2月4日

項目	単位	掛馬沖	高崎沖	玉造沖	湖心	麻生沖	釜谷沖	神宮橋	潮来	外浪逆浦	息栖
月日	-	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
天候	-	晴	晴	快晴	晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴
採泥時刻	時分	9:38	12:16	11:32	9:23	11:15	11:25	12:32	14:44	13:45	13:22
全水深	m	4.10	4.40	7.20	6.15	1.90	6.40	2.10	5.10	1.80	4.90
気温	℃	2.3	6.4	5.1	5.5	7.2	6.6	6.2	10.4	11.0	6.3
泥温	℃	6.2	7.4	7.0	5.7	5.7	8.4	6.3	5.6	5.8	6.7
泥の外観	-	オリーブ黒色	オリーブ黒色	オリーブ黒色	オリーブ黒色	暗オリーブ褐色	オリーブ黒色	オリーブ黒色	暗オリーブ褐色	暗オリーブ褐色	オリーブ黒色
泥の性状	-	シルト	シルト	シルト	シルト	砂	シルト	砂質土	砂	砂	砂
泥の臭気 (冷時)	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
TOC	mg/g乾泥	30.6	55.2	54.5	59.7	1.4	65.0	6.3	7.7	2.1	2.8
COD	mg/g乾泥	21.4	48.2	46.7	43.9	1.4	58.2	5.0	4.3	1.8	2.3
KN	mg/g乾泥	3.17	6.50	5.78	7.49	0.15	8.35	0.66	0.54	0.17	0.30
可溶性N	mg/g乾泥	0.007	0.050	0.102	0.073	<0.005	0.044	0.005	0.006	<0.005	<0.005
TP	mg/g乾泥	0.803	1.96	1.65	1.32	0.163	1.08	0.193	0.422	0.157	0.283
可溶性P	mg/g乾泥	0.004	0.003	0.004	0.008	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
pH(KCl)	-	7.40	7.13	7.11	7.00	7.58	7.28	6.18	6.96	7.08	7.05
硫化物	mg/g乾泥	0.24	0.69	0.60	0.35	0.01	0.28	0.08	0.03	0.02	0.02
水分	%	74.1	80.2	82.1	84.5	20.4	85.2	33.6	32.8	22.5	24.7
強熱減量	%	10.5	15.9	14.0	15.4	0.7	15.1	1.7	2.3	0.7	1.3
Pb	mg/kg乾泥	13.2	23.0	19.2	22.7	3.3	21.3	4.3	10.7	2.7	4.5
As	mg/kg乾泥	14.6	11.9	11.5	17.1	5.5	14.0	3.4	8.2	4.0	7.2
T-Hg	mg/kg乾泥	0.07	0.15	0.09	0.10	<0.01	0.13	0.01	0.01	<0.01	0.01
R-Hg	mg/kg乾泥	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/kg乾泥	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Cd	mg/kg乾泥	0.17	0.42	0.24	0.34	0.02	0.35	0.07	0.07	0.03	0.05
備考											

底質測定結果

採泥日：平成27年8月5日

[illegible]