



# 渡良瀬遊水地の主な外来生物

-----生態系被害防止外来種に指定されています！！-----

## ●セイタカアワダチソウ



- 特徴：背が高く、0.5~3mに達する。濃黄色の小さな花を多く付ける。
- 花期：秋
- 影響：根からアレロバシーという化学物質を出し、周囲の植物の成長を抑制。
- 一般的な防除方法  
7月下旬~8月中旬に刈り取ると、再生して、も背丈が小さい状態で花を付けるか、開花結実を行わずに冬季に枯死を迎える。

## ●オオブタクサ



- 特徴：葉は掌状に3~7裂、両面がザラザラしている。遊水地の道路沿いに多く見られる。
- 花期：8月~9月
- 影響：固有種を含む在来種と競合し、駆逐する。花粉症の原因ともなっている。
- 一般的な防除方法  
生育初期段階の防除が有効。

## ●セイバンモロコシ



- 特徴：夏から秋に、円錐花序の多数の小穂をつけた15~50cmの穂を出す。
- 花期：夏~秋
- 影響：畑作物や在来種との競合、穀物との交雑が指摘されている。
- 一般的な防除方法  
抜き取り、刈り取りによる防除が有効。

----- 特定外来生物に指定されています！！ -----

## ●オオキンゲイギク



- 特徴：直径5~7cmの黄橙色の花を咲かせ、葉は細長いヘラ状をしている。全国的に野生化し、河川敷や道路に大群落を作っている。
- 花期：春~初夏
- 影響：川原特有の在来種と競合し、駆逐する。
- 一般的な防除方法  
梅雨時に刈り払いを行い、結実を防ぐことが必要。

## ●アレチウリ



- 特徴：葉はザラザラで、粗い毛を密生させたツルを伸ばす。1cm程度の黄白色の花が集まって咲き、トゲを密生した果実をつける。
- 花期：夏~秋
- 影響：河川などで大繁殖し、ほかの植物がほとんど育成しない。
- 一般的な防除方法  
茎葉処理剤や、結実前の刈り取りといった、機械的の防除方法の併用が必要な難防除雑草。

## ●オオカワチシャ



- 特徴：近縁の在来種、カワチシャと交雑し、雑種を形成し、在来種の遺伝的搅乱が生じている。
- 花期：4月~7月
- 影響：近縁のカワチシャとの違いは、花の色が鮮やかな青紫色であることなど。
- 一般的な防除方法  
抜き取り、洪水搅乱体制の復元などが有効。

## 外来種被害予防3原則

- ①入れない
- ②捨てない
- ③拡げない

**在来種を守ろう!!**

### 《生態系被害防止外来種とは》

- 侵略性が高く、我が国の生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又はその恐れのある外来種を選定しています。
- 外来生物法に基づく規制の対象となる特定外来生物・未判定外来生物に加えて、同法の規制対象以外の外来種も幅広く選定しています。
- 国外由来の外来種だけでなく、国内由来の外来種も対象となっています。

## ★防除の仕方★

### 【地域やボランティア団体で防除する場合】

事前に防除活動について公表し、十分な拡散防止措置をとって防除してください。

### 【個人で防除する場合】

抜き取った植物を生きている状態で移動・運搬することは、外来生物法で禁止されています。草が飛び散らないよう、まず袋を密閉して日当たりのよい場所に数日置き、草が枯れたり腐ったりしてからごみ収集所に出してください。